


# Slik- en kauwstoornissen bij ziekte van Huntington



## Toelichting op het stroomdiagram

Stap	Functionaris	Activiteit	Omschrijving
1a.	Diëtist	Verwijzing zonder specifieke vraag bij slik- en kauwstoornis.	Omdat een (aspiratie)pneumonie de meest voorkomende doodsoorzaak is bij deze patiëntenpopulatie is het van belang dat hier tijdens een eerste consult aandacht voor is.
1b.	Zorg/arts	Constaateert verminderde slik- en kauwfunctie	De logopedist en diëtist worden altijd ingeschakeld via een consultaanvraag van de arts
2a.	Diëtist	Anamnese/0-meting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoesten/kuchen tijdens maaltijd</li> <li>• Boeren, braken, verslikken</li> <li>• Schokkering en ongeremd eten</li> <li>• Verminderde intake, ook specifieke voedingsmiddelen</li> <li>• Gewichtsverlies</li> </ul>
2b.	Logopedie	Stelt consistentie advies op en behandelplan Wanneer de logopedist nog niet betrokken is, wordt deze ingeschakeld	Overleg tussen diëtist en logopedist over doorvoeren van consistentie advies in dieetplan
3a.	Diëtist	Evalueren op indicatoren slik- en kauwstoornissen bij vervolgsulten	Zie indicatoren bij 2a. Omdat een (aspiratie)pneumonie de meest voorkomende doodsoorzaak is bij deze patiëntenpopulatie is het van belang dat dit tijdens vervolgsulten opnieuw bevraagd wordt.
3b.	Diëtist	Aangepaste consistentie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal</li> <li>• Dunne consistentie</li> <li>• Vloeibare voeding</li> <li>• Dik vloeibare voeding</li> <li>• Extra dik vloeibare voeding</li> <li>• Gemalen voeding</li> <li>• Zachte voeding</li> <li>• Smeuïge voeding</li> </ul>
4.	Diëtist	Diëtist stelt dieetplan op	Dieetplan wordt opgesteld op basis van consistentieadvies logopedie. Afhankelijk daarvan wordt er een dieetpreparaat ingezet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aandacht voor voldoende vocht (dehydratie is een bekende complicatie)</li> <li>• Adequate energie + eiwitintake. (ondervoeding is een bekende complicatie)</li> </ul>
4a.	Zorg	Producten worden door de afdeling besteld bij de leveranciers	
4b.	Diëtist	Melding maken bij Trombose dienst	Bij gebruik van Drinkvoeding kan vitamine D een interactie hebben antistolling medicatie
5.	Diëtist	Overleg met cliënt/zorg en MDO	<b>Korte termijn;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maandelijks diëtist + cliënt</li> <li>• 6wk overleg diëtist + afdeling</li> </ul> <hr/> <b>Lange termijn;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgleefplan bespreking;</li> <li>• Vaststellen / evalueren voedings- en weegbeleid</li> </ul>
6.	Diëtist/arts	Einde behandeling	Bij het behalen van de gestelde doelen wordt de behandeling gestopt of, bij wens van de cliënt of bij overlijden.
Einde			